

Tab. 1. Výsledky

1. Kdo je vedoucí trauma týmu ve Vaší nemocnici?		Poznámka
Traumatolog	8x	
Chirurg	2x	
Anesteziolog/intenzivista	1x	
Traumatolog nebo lékař urgentního příjmu	1x	
Jiný	0x	
2. Kdo by měl být dle Vašeho názoru vedoucím trauma týmu?		
Traumatolog	9x	
Traumatolog nebo lékař urgentního příjmu	1x	
Traumatolog nebo chirurg	1x	
Traumatolog nebo anesteziolog intenzivista	1x	
Jiný	0x	
3. Z kolika osob je tvořen trauma tým?		
5 osob	3x	
6 osob	4x	
7 osob	3x	
8 osob	1x	
9 osob	3x	
10 osob	1x	
4. Kdo je členem trauma týmu?		
Traumatolog / úrazový chirurg / ortoped	11x	
Chirurg	5x	
Anesteziolog/intenzivista/urgentista	12x	
Radiolog	7x	
Neurochirurg	1x	
Sestry	4x 2 sestry	6x 3 sestry 2x 4 sestry
Sanitář	10x ano	2x není uveden
Radiologický asistent	3x	8x neuveden
5. Podáváte plnou krev u traumatických pacientů?		
Ano	5x	
Ne	7x	
6. Má použití plné krve, dle vašeho názoru, indikaci v této skupině pacientů?		
Ano	7x	
Ne	5x	
7.1 Jak definujete oběhovou nestabilitu u traumatického pacienta?		
Systolický tlak 90 torr bez vasopresorů, srdeční akce ≥ 110 bez vasopresorů, přítomnost vasopresorů, systolický tlak ≤ 100 torr s vasopresory, srdeční akce ≥ 120 s vasopresory, šokový index nad 1	1x	
Systolický tlak 80 torr bez vasopresorů, přítomnost vasopresorů	1x	
Přítomnost vasopresorů, šokový index nad 1	2x	
Systolický tlak 80 torr bez vasopresorů, šokový index nad 1	1x	
Systolický tlak 80 torr bez vasopresorů, srdeční akce ≥ 120 bez vasopresorů	1x	
Systolický tlak 90 torr bez vasopresorů, přítomnost vasopresorů	1x	
Systolický tlak 90 torr bez vasopresorů, srdeční akce ≥ 110 bez vasopresorů, přítomnost vasopresorů, systolický tlak ≤ 100 torr s vasopresory, srdeční akce ≥ 100 s vasopresory, klinický stav, laboratorní odběry	1x	
Systolický tlak 90 torr bez vasopresorů, srdeční akce ≥ 120 bez vasopresorů	1x	
Systolický tlak 80/90 torr s vasopresory	1x	
Přítomnost vasopresorů, šokový index nad 1, laktát $> 2,2$; BE < -3	1x	
Neexistuje jednoduchá odpověď, závisí na věku, rezervách, charakteru poranění, delay k ošetření	1x	
7.2 Souhlasíte s tvrzením, že oběhovou stabilitu můžeme definovat jako systolický tlak $\geq 80-90$ torr bez vasopresorické podpory? Pokud je systolický tlak $\geq 80-90$ torr udržovaný vasopresory, jedná se o hraniční stabilitu? Pokud se nedaří udržet systolický tlak $\geq 80-90$ torr ani vasopresory, jedná se o oběhovou nestabilitu?		
Ano	12x	
Ne	0x	
7.3 Souhlasíte s tvrzením, že srdeční frekvence je důležitá při posouzení oběhové stability a může sloužit jako pomocné kritérium? Srdeční frekvence $< 120/\text{min}$ rovná se oběhová stabilita, srdeční frekvence $120-130/\text{min}$ rovná se hraniční stabilita, srdeční frekvence $> 130/\text{min}$ rovná se oběhová nestabilita?		
Ano	12x	
Ne	0x	